

**BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 13 din 31 HARTIE 2025

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐ , din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

**MONILIOZĂ, PĂTAREA ROȘIE A FRUNZELOR, DEFOLIATORI, INSECTE MINATOARE, ACARIENI**

care poate cauza pierderi importante la: **PRUN, CIREȘ ȘI VIȘIN**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

**MONILIOZA:** SUNT ATACATE FLORILE ȘI RAMURILE TINERE, ULTERIOR BOALA SE MANIFESTĂ PE FRUNZE PRIN APARIȚIA UNOR BRUNIFICĂRI LA NIVELUL ȚESUTURILOR

**PATAREA ROSIE A FRUNZELOR:** PE FRUNZE APAR PETE CIRCULARE, DE CULOARE GALBEN-CREM, APOI PORTOCALII, IAR ÎN FINAL ROSII. ȚESUTURILE DIN DREPTUL PETELOR SE ÎNGROAȘĂ, DEVIN CRUSTOASE ȘI SUNT BOMBATE USOR SPRE PARTEA INFERIOARĂ. ÎN FINAL FRUNZELE ATACATE CAD, PRODUCÂND DEFOLIEREA PREMATURĂ A POMILOR. ASTFEL, POMUL ESTE SENSIBIL LA ÎNGHEȚ, IAR DIFERENȚIEREA MUGURILOR DE ROD NU SE DESFĂȘOARĂ NORMAL.

**ACARIENI:** ÎNȚEAPĂ FRUNZELE ȘI SUG SEVA, FAPT CARE AFECTEAZĂ HRANIREA NORMALĂ A FRUCTELOR

**VIESPEA SÂMBURILOR DE PRUN:** ARE O GENERAȚIE PE AN ȘI IERNEAZĂ CA LARVĂ ÎN SÂMBURII FRUCTELOR ATACATE. CÂND ÎNCEPE SCUTURAREA PRIMELOR PETALE ALE FLORILOR DE PRUN APAR PRIMII ADULȚI CARE IES DIN SÂMBURI PRIN ORIFICII CIRCULARE DE 1,0 – 1,6 MM DIAMETRU ROASE DE VIESPI ÎN PERETELE SÂMBURELUI. DUPĂ 4 – 12 ZILE FIECARE FEMEIA DEPUNE CÂTE UN OU/SÂMBURE. LARVELE APĂRUTE SE HRĂNEȘC CU SĂMÂNȚA FRUCTULUI ABIA FORMAT ȘI RĂMÂN ÎN FRUCT PÂNĂ ÎN PRIMĂVARA URMĂTOARE. ATACUL PRODUS DE LARVE SE MANIFESTĂ PRIN CADEREA PREMATURĂ A FRUCTELOR ÎNAINTE DE ÎNTRAREA ÎN PÂRGĂ. FRUCTELE ATACATE POT FI RECUNOSCUTE CHIAȚ ÎNAINTE DE CĂDEREA DIN POM, DEOARECE AU O COLORAȚIE VIOLACEE, O UȘOARĂ ASIMETRIE ȘI UN ÎNCEPUT DE VESTEJIRE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

**LA SFÂRȘITUL ÎNFLORITULUI (TOATE PETALELE S-AU SCUTURAT)**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

**LUNA EXPERIENCE 400 SC= 0,5 L/HA+ KARATE ZEON / (NINJA) =0,015%**

Alte recomandări:

**\* PENTRU ACARIENI SE POATE UTILIZA PRODUSUL NISSORUN 10WP= 0,3 KG/ HA**

**\* PENTRU VIESPEA SAMBURILOR DE PRUN ( EURYTOMA SCHREINERI ) TRATAMENTUL SE REPETĂ LA 7-10 ZILE SI SE POATE FOLOSI PRODUSUL LASER 240 SC/ (NEXSUBA=0,6 L/HA**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

**Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.**

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -

*Autoritatea Națională Fitosanitară ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și Federația Asociațiilor Apicole din România – ROMAPIS ( nr 103/ 21.10.2016 ) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.*

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

**ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare**

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRUL**

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratam.<br>(ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării (feno faza) | Tratamentul efectuat                          |                     |                              |               |                             | Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului i, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                              |                                           |                              | Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni | Denumie ppp folosit | Doza omologaă /doza folosită | Suprafața, ha | Cantități utilizate (kg, l) |                                                                                   |                                              |                                                             |
|                                              |                                           |                              |                                               |                     |                              |               |                             |                                                                                   |                                              |                                                             |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**