

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 41 din 28.Mai 2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere ☐ solarii ☐ răsadnițe ☐, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

CERCOSPORIOZA SFECLEI (CERCOSPORA BETICOLA)

care pot cauza pierderi importante la cultura **SFECLA DE ZAHĂR**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

CERCOSPORIOZA SFECLEI: SE MANIFESTĂ LA NIVEL FOLIAR PRIN PREZENȚA A NUMEROASE PETE CIRCULARE, DE CULOARE MARO ȘI MARGINI PURPURI. ACESTE PETE SE UNESC, IAR FRUNZELE SE USUCĂ. ODATĂ CU EVOLUTIA BOLII, SCADE CAPACITATEA DE FOTOSINTEZĂ A FRUNZELOR, VIGOAREA PLANTELOR ȘI CAPACITATEA DE ACUMULARE A SUBSTANȚELOR UTILE.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

**CONSTATAREA PRIMELOR PETE PUNCTIFORME PE FRUNZĂ
(30-80 PETE PUNCTIFORME / FRUNZĂ)**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

SEKVENCA = 0,4 L/HA

Alte recomandări:

* UTILIZAREA PRODUSULUI ÎMPREUNĂ CU ADJUVANTUL DESIGNER® = 0,1 L/HA - 0,2 L/HA SPOREȘTE PERSISTENȚA SUBSTANȚEI ACTIVE PE FRUNZĂ ȘI MĂREȘTE GRADUL DE ABSORBȚIE AL ACESTEIA LA NIVEL FOLIAR.

* SE POT EFECTUA DOUĂ TRATAMENTE CU SEKVENCA ÎN DOZĂ DE 0,4 L/HA LA INTERVAL DE 10 - 28 DE ZILE, CU TIMP DE PAUZĂ DE 28 ZILE

* PENTRU DĂUNĂTORI CA: PURICELE SFECLEI, MUSCA SFECLEI, BUHA SEMĂNĂTURILOR, FLUTURI DE NOAPTE SE POATE UTILIZA PRODUSUL CYCLONE (FASTER GOLD 50 EC) = 0,15 L/HA

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8).

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al

ACA din România: 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul

Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua - luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno - faza)	Tratatamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruienii	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.42.....din.....28.MAI.....2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere și solarii răsadnițe, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

**PĂTAREA UNGHIULARĂ A FRUNZELOR (PSEUDOMONAS LACHRYMANS)
TRATAMENTUL II**

care poate cauza pierderi importante la cultura: **CASTRAVEȚI**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

PĂTAREA UNGHIULARĂ A FRUNZELOR: ATACUL SE MANIFESTĂ PE FRUNZE, FRUCTE, FLORI
PE MARGINEA FRUNZELOR APAR PETE MICI, NEREGULATE, CU ASPECT UMED, DE
CULOARE GRI APOI VERDE DESCHIS- GALBEN PAL, DE FORMĂ POLIGONALĂ-UNGHIULARĂ.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

LA CONSTATAREA PRIMELOR INFECȚII

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

FLOWBRIX/ (COPPER-FIELD) = 2,6 ML/10 MP ÎN GRĂDINĂ SAU 2,6 L/HA ÎN CÂMP

Alte recomandări:

* TRATAMENTUL SE REPETĂ DUPĂ 10 ZILE

* PENTRU FĂINARE SE POATE UTILIZA PRODUSUL THIOVIT JET 80 WG= 5,0 KG/HA (EFFECT
SECUNDAR ASUPRA ACARIENILOR)

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru țesăturile avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apă din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7-8); Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA www.aiprom.ro

Luăți măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul

Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Autoritatea Națională Fitosanitară (nr. 3242/F/21.10.1016) și Federația Asociațiilor Apicole din România - RÔMAPIS (nr 103/ 21.10.2016) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza și avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății.....
(Comuna, județul).....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno fază)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/burnieni	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct I (i),(1) Constituite contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.

BULETIN DE AVERTIZARENr. 40 din 28 MAI 2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spațiile protejate: sere și solarii răsadnițer, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii :

**PĂDUCHELE DIN SAN JOSE (QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS) GI
RAPĂNUL MĂRULUI (VENTURIA INEQUALIS),
FĂINARE (PODOSPHERA LEUCOTRICHIA),
FOCUL BACTERIAN (ERWINIA AMYLOVORA),**

care poate cauza pierderi importante la: **MĂR, PĂR**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

PĂDUCHELE DIN SAN JOSE: ZONELE AFECTATE DE PĂDUCHE SE ÎNROȘESC ȘI SE NECROZEAZĂ DIN CAUZA UNEI SUBSTANȚE TOXICE PE CARE PĂDUCHELE O INJECTEAZĂ ÎN TIMP CE SE HRĂNEȘTE.

RAPĂNUL MĂRULUI : AFECTEAZĂ TOATE ORGANELE VERZI ALE PLANTEL. ATACUL SE MANIFESTĂ LA ÎNCEPUT PRIN APARIȚIA UNOR PETE MICI, CU ASPECT CATIFELAT CU DIMENSIUNI DE 0,5-6 MM DE CULOARE VERDE -MASLINIE, SAU BRUN- NEGRICIOASĂ CU UN CONTUR DIFUZ. LA ATACURI PUTERNICE PETELE POT SA CONFLUEZE.

FĂINAREA: ATACĂ FRUNZELE, LĂSTARIILE TINERI, RAMURILE, FLORILE, MAI RAR FRUCTELE. SE MANIFESTA PRIN APARIȚIA UNEI PĂSLE MICELIENE ALBICIOSE - GĂLBUI.

FOCUL BACTERIAN: PRIMELE SIMPTOME APAR PE FLORI, CARE AU UN ASPECT HIDROZAT, SE OFILESC, SE BRUNIFICĂ ȘI SE ÎNNEGRESC. INFECTIA COBOARĂ SPRE PEDUNCULI CARE SE ÎNNEGREȘTE. BACTERIA POATE AFECTA TOATE ORGANELE AERIENE. LĂSTARIILE BOLNAVI ȘI FRUNZELE MOARTE APAR CA ȘI CUM AR FI ARSE DE FOC. LĂSTARIILE ATACAȚI SE ÎNDOAIE SUB FORMĂ DE CĂRJĂ.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

CÂND FRUCTELE AU DIAMETRUL DE 2,5-3,0 CM

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

POLECT / (DECA 2,5 EC) = 0,05-0,075 % + SERCADIS= 0,25 L/HA

Alte recomandări:

* PENTRU ERWINIA AMYLOVORA SE POATE UTILIZA PRODUSUL ALIETTE 80 WG= 3,75 KG/HA

* PENTRU ACARIENI SE POATE UTILIZA PRODUSUL NISSORUN = 1 KG/HA

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare!

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 - 8;

Clătiți de 3 ori recipientii și livrați ambalajele și apele uzate la operatorii economiei care efectuează neutralizarea acestora > program SCAPA www.aiprom.ro

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictete normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) și *Federația Asociațiilor Apicole din România - ROMAPIS* (nr 103/ 21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno- faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruienii	Denumire ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața	Cantități utilizate (kg,l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști ai prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.